



SUP-ICU trial

Inklusionskriterier

- ✓ Akut indlagt på intensiv afdeling
- ✓ Mindst 18 år gammel
- ✓ Mindst én af følgende:
 - Shock (kontinuerlig infusion af vasopressor eller inotropika, MAP < 70 mmHg, systolisk blodtryk < 90 mmHg ELLER laktat > 4 mmol/l)
 - Akut eller kronisk, intermitterende eller kontinuerlig dialyse
 - Invasiv mekanisk ventilation med forventet varighed > 24 timer. Ved tvivl svar 'JA'
 - Akut koagulopati (trombocyetter < $50 \times 10^9/l$, INR > 1.5 ELLER PT > 20 sekunder)
 - Kronisk koagulopati (trombocyetter < $50 \times 10^9/l$, INR > 1.5 ELLER PT > 20 sekunder indenfor de seneste 6 måneder før hospitalsindlæggelse)
 - AK behandling (IKKE tromboseprofilakse eller profilaktisk acetylsalicylsyre)
 - Kronisk leversygdom (anamnese med portal hypertension, blødende eosophagusvaricer eller hepatiske encephalopati, eller cirrhose bekræftet ved biopsi, CT eller ultralyd)

Eksklusionskriterier

- ✗ Kontraindikationer for protonpumpehæmmer (**inklusiv behandling med atazanavir (HIV medicin)**)
- ✗ Igangværende daglig behandling med PPI og/eller H2-receptor antagonister
- ✗ Gastrointestinal blødning af enhver oprindelse under nuværende hospitalsindlæggelse
- ✗ Diagnosticeret med peptisk ulcus under nuværende hospitalsindlæggelse
- ✗ Organtransplantation under nuværende hospitalsindlæggelse
- ✗ Hjernedød eller ophørt aktiv terapi
- ✗ Fertile kvinder med positiv graviditetstest (urin eller plasma hCG)
- ✗ Manglende samtykke (forsøgsvargesamtykke fra 2 læger)