



## AID-ICU trial

### Inklusionskriterier

- ✓ Akut indlagt på intensivafdelingen
- ✓ Mindst 18 år gammel
- ✓ Diagnosiceret delirium med valideret screeningsværktøj CAM-ICU eller ICDSC

### Eksklusionskriterier

- ✗ Kontraindikationer for haloperidol: Intolerance over for haloperidol eller additiver, kendt Parkinsons sygdom eller andre ekstrapyramidale symptomer, kendt QTc forlængelse, kendt med tardiv dyskinesi, komatøs tilstand (nonfarmakologisk), tidlige ventrikulær arytmier eller torsades de pointes, ukontrolleret hypokaliæmi
- ✗ Fast behandling med antipsykotika
- ✗ Tidlige behandling med antipsykotika på intensivafdelingen forud for inklusion
- ✗ Permanent inhabil (ex. Demens, mental retardering)
- ✗ Deliriumscoring ej mulig (ex. sprogbarriere, blindhed, døvhed)
- ✗ Palliative patienter
- ✗ Fertile kvinder (< 50 år) med positiv urin hCG eller plasma hCG
- ✗ Delirium på basis af alkohol misbrug (delirium tremens)
- ✗ Patienter under tvangsindehægelse
- ✗ Samtykke kan ikke indhentes (forsøgsvarige, pårørende)