



Blanding af forsøgsmedicin for patienter, som allerede har fået dexamethason på dagen for screening (top up procedure)

Hvis patienten har fået 6.7 mg intravenøs (IV) dexamethason (svarende til 8 mg dexamethasonfosfat Dexavit™) eller mindre på dagen for screening ELLER

Hvis patienten har fået 8 mg per oral (PO) dexamethason eller mindre på dagen for screening

1. Stop den nuværende ordination på dexamethason
2. Screen, randomisér og giv forsøgsmedicin som følgende:
 - a. Hvis patienten er randomiseret til 12 mg: giv 6 mg dexamethason i isotonisk saltvand som bolusinjektion (bolusvolumen 5 ml) på dagen for screening. Giv 12 mg dexamethason som bolusinjektion de resterende dage i interventionsperioden.
 - b. Hvis patienten er randomiseret til 6 mg: giv 5 ml isotonisk saltvand som bolusinjektion på dagen for screening. Giv 6 mg dexamethason som bolusinjektion de resterende dage i interventionsperioden.

Hvis patienten har fået mere end 6.7 mg IV dexamethason (mere end 8 mg dexamethasonfosfat Dexavit™) ELLER mere end 8 mg PO dexamethason på dagen for screening

1. Stop den nuværende ordination på dexamethason
2. Screen patienten minimum 12 timer efter sidste administration af dexamethason; hvis patienten stadig er inkluderbar, randomisér, bland og giv forsøgsmedicin (12 eller 6 mg) til patienten. Vær opmærksom på, at dexamethasonbehandling i 5 sammenhængende dage eller mere er et eksklusionskriterium i COVID STEROID 2 forsøget.